

6. 主産地の生育・出荷動向

産地名	作付面積	作況	生育進度	出荷進度
岩手県奥中山 (7/14)	前年並み	前年並み	前年並み	前年並み
群馬県あがつま (7/13)	減少	前年並み	平年並み	平年並み
長野県南佐久 (7/9)	減少	平年並み	遅い	やや遅い

※特記ない場合は平年比。()内は調査日。
(機構調べ)



岩手県奥中山：圃場の写真

7. 主産地の向こう1ヶ月の気象情報 (7/31~8/27：毎週更新)

予測地点	要素	予報期間							
		7/31 ~ 8/6		8/7 ~ 8/13		8/14 ~ 8/20		8/21 ~ 8/27	
		予報	平年	予報	平年	予報	平年	予報	平年
盛岡	平均気温(°C)	27.5	24.3	26.1	24.1	24.7	23.6	23.9	22.9
	日照時間(時間)	10.5	35.1	26.1	34.6	29.5	31.9	31.0	31.4
	降水量(mm)	13.6	37.0	35.5	40.4	31.6	42.6	22.3	42.6
田代	平均気温(°C)	24.5	20.3	23.4	20.1	21.5	19.7	21.3	19.0
	日照時間(時間)	10.9	36.9	19.4	35.4	32.7	31.7	23.7	29.5
	降水量(mm)	13.4	34.4	34.1	35.4	18.3	36.6	26.1	38.6
沼田	平均気温(°C)	29.0	25.3	27.9	25.1	26.2	24.6	25.9	23.9
	日照時間(時間)	23.0	49.0	24.1	47.5	36.9	43.6	32.6	41.1
	降水量(mm)	7.1	33.0	36.9	33.0	19.1	38.1	51.3	43.5
佐久	平均気温(°C)	23.5	24.3	25.0	24.2	23.0	23.7	22.9	23.1
	日照時間(時間)	10.9	47.6	24.9	46.5	38.6	44.1	31.2	42.1
	降水量(mm)	14.7	20.5	26.0	22.9	12.3	24.5	18.1	24.2
野辺山	平均気温(°C)	23.6	20.0	22.8	19.9	21.2	19.6	21.5	19.0
	日照時間(時間)	20.6	39.3	30.4	38.0	36.4	35.5	25.0	33.8
	降水量(mm)	19.2	31.2	25.5	37.0	20.0	40.0	28.6	37.2
松本	平均気温(°C)	25.8	25.7	26.7	25.5	24.8	25.1	24.7	24.4
	日照時間(時間)	8.7	49.4	34.3	47.6	36.8	45.3	34.5	42.9
	降水量(mm)	23.1	20.0	23.1	21.0	10.2	20.4	13.9	23.3

(機構調べ)


8. 輸入動向 (生鮮結球レタス)

○101 t (6月輸入量)

➤ 前年同月比：137%

○輸入先国ベスト3

- 1位 米国 80トン
- 2位 中国 20トン
- 3位 カナダ 1トン



(財務省貿易統計)

9. 一口メモ

レタスには、骨の形成に欠かせないビタミンKや塩分を体外に排出するカルシウムが豊富に含まれています。

初期生育時の降雨と低温により生育遅れとなった長野産及び群馬産は、梅雨明け後の好天で生育が回復基調になったものの、その後的高温乾燥により小玉傾向となったため、市場入荷量が伸びずに価格は平年並みで推移しました。

8月は、降雨により長野産の乾燥傾向が解消されれば徐々に結球が進むものの、市場入荷量の伸びは緩やかなことから、価格は平年並みの見込みです。

本データは全てベジ探から入手できます。
詳細はベジ探をご覧ください。

ベジ探：<https://vegetan.alic.go.jp/>
<問い合わせ先>

農畜産業振興機構

野菜業務部 管理課

野菜振興部 需給業務課

Tel:03-3583-9793